

Памятка для пациентов перед проведением седации

Для предотвращения осложнений во время анестезии Вам следует соблюдать следующие условия:

- не принимать пищу в течение 6 часов до анестезии;
- не пить любые напитки, включая воду, за 2 часа до анестезии;
- в течение суток до проведения анестезии не принимать алкоголь.

Перед проведением вмешательства Вам может потребоваться электрокардиограмма.

Обязательно сообщите анестезиологу, если:

- Вы страдаете сахарным диабетом;
- у Вас повышенное давление;
- Вы страдаете ишемической болезнью сердца или переносили инфаркт миокарда;
- у Вас есть хронические заболевания органов дыхания (например, бронхиальная астма);
- в ближайшее время (две недели) переносили ОРВИ или грипп;
- Вы постоянно принимаете любые лекарственные препараты (желательно заранее подготовить список этих препаратов);
- Вам уже делали анестезию, и после неё возникли осложнения.

К причинам, исключающим возможность проведения анестезии в амбулаторных условиях, можно отнести: нестабильность общего состояния (обострение хронических заболеваний), острые воспалительные или инфекционные заболевания, не связанные с предстоящим вмешательством, патологическое ожирение, наличие наркотической зависимости, отсутствие голодной паузы.

После осмотра врача-анестезиолога и при наличии у Вас противопоказаний к исследованию под седацией анестезиологическое пособие может быть отменено.

В день проведения процедуры после анестезии Вам следует отказаться от:

- выполнения работ, связанных с необходимостью повышенной концентрации и внимания;
- управления транспортным средством;
- употребления алкоголя.

Обновлено: 27.09.2026